



<https://www.agrosava.com/teatar>

ZA PEPELNICAU I PLAMENJACU

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kategorija:

[Fungicidi](#)

Aktivna materija:

Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (SC)

Kategorija:

[Fungicidi](#)

Aktivna materija:

Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:

11

Pakovanje:

5 ml, 100 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač:

Chemical Agrosava

Karenca:

Paradajz	–	3	dana
Krastavac	–	4	dana
Malina	–	10	dana
Krompir	–	14	dana
Vinova loza – 21 dan			

PRIMENA**Fungicid i hromistacid sa preventivnim i kurativnim delovanjem**

MALINA: za suzbijanje prouzrokovaca kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (*Didymella applanata*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).

Vreme primene: tokom intenzivnog porasta mladara do početka cvetanja i neposredno posle berbe maline (faze 19-55 i 91 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Plasmopara viticola*) i prouzrokovaca pepelnice (*Uncinula necator*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).

Vreme primene: preventivno, najkasnije po pojavi prvih primarnih pega, a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

KROMPIR I PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Phytophthora infestans*) i crne pegavosti (*Alternaria solani*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).

Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za sekundarne zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

KRASTAVAC: za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).

Vreme primene: preventivno, od dva prva lista (faze 12-102 BBCH skale). Primenjuje se folijarno uz utrošak vode 600-1.000 l/ha (6-10 ml/100 m²). Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi azoksistrobina imaju širok spektar delovanja na biljne bolesti, kratku karencu i izražen fiziološki efekat (zeleni efekat) na biljke, čime zauzimaju posebno mesto u zaštiti povrća. Tehnologija proizvodnje cveća zahteva zdrave biljke sa ispunjenim međunarodnim standardima u pogledu boje, broja latica i dužine. **Teatar** se može koristiti u zaštiti cveća kada dolaze do izražaja njegov zeleni efekat i fungicidna svojstva. U proizvodnji kupina **Teatar** se primenjuje neposredno posle berbe za zaštitu od bolesti stabla (*Didymella applanata*, *Septocyta ruborum*).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Teatar se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

KARAKTERISTIKE

Teatar je lokalsistemični fungicid na bazi aktivne materije azoksistrobin sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Preparat ima širok spektar delovanja, što ga uz kratku karencu čini pogodnim za primenu u zaštiti povrća. **Teatar** je u povrtarskoj proizvodnji posebno namenjen za suzbijanje bolesti kao što su plamenjače koje se brzo razvijaju. Inhibira klijanje spora i rast micelija, a ima i antisporulaciono delovanje. Iz tog razloga, njegova primena je preventivna sa izvesnim kurativnim delovanjem na razvoj micelije plamenjače u biljnom tkivu. Da bi se izbegla pojava rezistentnosti, **Teatar** treba koristiti u alternaciji sa aktivnim materijama koje imaju multi-site efekt kao što su fluazinam (**Niveral**), mankozeb (**Mankosav**) itd. **Teatar** je našao posebnu primenu u suzbijanju bolesti maline u prvom tretiranju posle berbe, a u drugom se koristi preparat na bazi bakra kao što je [Everest](#).

TEHNIČKE INFORMACIJE

PRIMENA

Fungicid i hromistacid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

MALINA: za suzbijanje prouzrokovaca kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (*Didymella applanata*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: tokom intenzivnog porasta mladara do početka cvetanja i neposredno posle berbe maline (faze 19-55 i 91 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Plasmopara viticola*) i prouzrokovaca pepelnice (*Uncinula necator*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).

Vreme primene: preventivno, najkasnije po pojavi prvih primarnih pega, a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

KROMPIR I PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Phytophthora infestans*) i crne pegavosti (*Alternaria solani*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).

Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za sekundarne zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

KRASTAVAC: za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).

Vreme primene: preventivno, od dva prva lista (faze 12-102 BBCH skale). Primenjuje se folijarno uz utrošak vode 600-1.000 l/ha (6-10 ml/100 m²). Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi azoksistrobina imaju širok spektar delovanja na biljne bolesti, kratku karenicu i izražen fiziološki efekat (zeleni efekat) na biljke, čime zauzimaju posebno mesto u zaštiti povrća. Tehnologija proizvodnje cveća zahteva zdrave biljke sa ispunjenim međunarodnim standardima u pogledu boje, broja latica i dužine. **Teatar** se može koristiti u zaštiti cveća kada dolaze do izražaja njegov zeleni

efekat i fungicidna svojstva. U proizvodnji kupina **Teatar** se primenjuje neposredno posle berbe za zaštitu od bolesti stabla (*Didymella applanata*, *Septocyta ruborum*).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Teatar se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

TEATAR

Ca Chemical
Agrosava

RNPP046AHAI05 28/05/2019

Превентивни системични, трансламинарни фунгицид у облику концентроване суспензије (SC), беле боје

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна материја: азоксистробин 250 g/l ± 12,5 g/l

Хемијски назив: metil (E)-2-(2-[6-(2-цијанофеноксил)-4-илокси]фенил)-3-метокси акрилат

Техничка чистоћа: мин. 97%

CAS: 131860-33-8

ПРИМЕНА: TEATAR је системични, трансламинарни фунгицид који се користи за сузбијање:

- сушења ластара: бели младари малине (*Didymella applanata*);
- пламењаче винове лозе (*Plasmopara viticola*);
- пепелнице винове лозе (*Uncinula necator*);
- пламењаче кромпира и парадајза (*Phytophthora infestans*);
- црне пегавости кромпира и парадајза (*Alternaria solani*);
- пламењаче краставца (*Pseudoperonospora cubensis*).

Време и концентрација примене: примењује се превентивно, пре остваривања услова за инфекцију, у концентрацији 0,075% (7,5 ml у 10 l воде) код малине и винове лозе и у количини примене 0,75 l/ha (7,5 ml на 100 m²) код кромпира, парадајза и краставца.

Код малине: током интензивног пораста избојака, до почетка цветања и непосредно после бербе малине (фаза 10-55 BBCH и 91 BBCH скале).

Код винове лозе:

- пламењача – по појави првих примарних пеге, а пре стицања услова за секундарно заражавање;
- пепелница – превентивно, најкасније по појави првих симптома.

Код кромпира и парадајза: превентивно, у време када се остваре услови за секундарне заразе или најкасније по појави првих симптома болести.

Код краставца: превентивно, од два прва листа (фаза 12-102 BBCH скале).

Начин примене и количина течности по јединици површине: примењује се фолијарно, тракторским или леђним прскалицама или орошивачима уз утрешак чисте воде 600–1000 l/ha.

Максималан број третирања на истој површини у току године: два пута.

Третирање из ваздухоплова: није дозвољено.

Могућност мешања (компатибилност): може се мешати са већином фунгицида и великим бројем других пестицида. Пре мешања са другим препаратима треба проверити њихову компатибилност.

Негативно деловање средства за заштиту биља:

На биљке (фитотоксичност): када се препарат примени према упутству произвођача нема опасности од појаве фитотоксичности.

На водене организме (токсичност): токсично по водене организме. Може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој средини.

На воде (контаминација): приликом третирања поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

Каренца: парадајз – 3 дана; краставац – 4 дана; малина – 10 дана; кромпир – 14 дана; винова лоза – 21 дан.

Толеранца (МДК): винова лоза – 3 mg/kg; малина – 5 mg/kg; парадајз – 3 mg/kg; кромпир – 7 mg/kg; краставац – 1 mg/kg.

Симптоми и знаци тровања: након контакта са кожом и очима код осетљивих особа може доћи до појаве црвенила. Екстраполацијом налаза добијеног на експерименталним животињама може се претпоставити да је након инхалационог уноса могућа појава кашља и бола у грлу, као и системског штетног ефекта на здравље, укључујући и ефекат на јетру. Након ингестије, могућа је појава неспецифичних симптома, укључујући и мучнину, повраћање, слабост и бол у стомаку.

Мере прве помоћи: у случају контакта са кожом неопходно је уклонити одећу и обилно испирати водом и сапуном (најмање 15 минута). У случају контакта са очима неопходно је прво уклонити сочива, а након тога обилно испирати водом (најмање 10 минута). Након ингестије/инхалације/контакта са очима обавезно се обратити надлежној медицинској установи.

При инхалационој експозицији изнети особу из контаминиране атмосфере, а уколико дође до престанка дисања обезбедити вештачку вентилацију. Не изазивати повраћање. Не постоји специфични антидот, терапија је симптоматска.

Лечење: за детаљна упутства о лечењу обратити се Центру за контролу тровања ВМА, телефон 011/36 08 440, Црнотравска 17, Београд.

Мере заштите: приликом рада са препаратом не пити, не јести, не пушити, избегавати контакт са кожом и очима и носити одговарајућу заштитну одећу, гумене чизме и гумене рукавице, заштиту за лице и очи. После руковања, скинути заштитну одећу и средства и опрати се водом и сапуном. У просторијама спровести адекватну вентилацију и контролисати ниво експозиције. Уколико је потребно, носити одговарајуће респираторе.

Складиштење: чувати у добро затвореној, оригиналној амбалажи, у просторијама са вентилацијом, на хладном и сувом месту, далеко од сунчеве светлости и извора топлоте, ван дохвата деце и одвојено од хране, пића и сточне хране. Избегавати складиштење изнад 35°C.

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ

Припрема за рециклажу:

- Након употребе садржај амбалаже оцедити око 30 секунди.
- Садржај прелити у прскалицу.
- Испрану течност утвршити заједно са припремљеним раствором за третирање.

Прикупљање:

- Враћање празне амбалаже врши се два пута годишње.
- Празна амбалажа мора задржати постојећу декларацију због утврђивања порекла амбалаже пестицида.

TEATAR

RNPP046AHAI05

28/05/2019

CA Chemical
Agrosava

Превентивни системични, трансламинарни фунгицид у облику концентроване суспензије (SC), беле боје

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна материја: езоксистробин 250 g/l ± 12,5 g/l
Хемијски назив: methyl (E)-2-(2-(6-(2-cijanotetoksil)-4-fluksilfenil)-3-metoksilakrilat)
Техничка чистота: мин. 97%
CAS: 151860-33-8

ПРИМЕНА: TEATAR је системични, трансламинарни фунгицид који се користи за сузбијање:

- сушене пастарабелне младари малине (*Didymella applanata*);
- пламенање винове лозе (*Plasmopara viticola*);
- пепелице винове лозе (*Uncinula necator*);
- пламенање кромпира и парадајза (*Phytophthora infestans*);
- црне петовости кромпира и парадајза (*Alternaria solani*);
- пламенање краставаца (*Pseudoperonospora cubensis*).

Време и концентрација примене: примењује се превентивно, пре остваривања услова за инфекцију, у концентрацији 0,075% (7,5 ml у 10 l воде) код малине и винове лозе и у количини примене 0,75 l/ha (7,5 ml на 100 m²) код кромпира, парадајза и краставаца.

Код малине: током интензивног пораста избојака, до почетка цветања и непосредно после бербе малине (фаза 10-55 BBCH и 91 BBCH скале).

Код винове лозе:

- пламенање – по појави првих примарних пега, а пре стицања услова за секундарно заражавање;
- пепелица – превентивно, најкасније по појави првих симптома.

Код кромпира и парадајза: превентивно, у време када се остваре услови за секундарне заразе или најкасније по појави првих симптома болести.

Код краставаца: превентивно, од два прва листа (фаза 12-102 BBCH скале).

Начин примене и количина течности по јединици површине: примењује се фолијарно, тракторским или леђним прскалицама или орошачима (уз утрощак чисте воде 600-1000 l/ha).

Максимални број третирања на истој површини у току године: два пута.

Третирање из ваздухоплова: није дозвољено.

Могућност мешања (компатибилност): може се мешати са већином фунгицида и великим бројем других пестицида. Пре мешања са другим препаратима треба проверити њихову компатибилност.

Негативно деловање средстава за заштиту биља:

На биљке (фитотоксичност): када се препарат примени према упутству произвођача нема опасности од појаве фитотоксичности.

На водене организме (токсичност): токсично по водене организме. Може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој средини.

На воде (контаминација): приликом третирања поштовати водоштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

Каренца: парадајз - 3 дана; краставац - 4 дана; малина - 10 дана; кромпир - 14 дана; винова лоза - 21 дан.

Толеранца (МДК): винова лоза - 3 mg/kg; малина - 5 mg/kg; парадајз - 3 mg/kg; кромпир - 7 mg/kg; краставац - 1 mg/kg.

Симптоми и знаци тровања: након контакта са кожом и очима код осетљивих особа може доћи до појаве црвенила. Екстраполацијом налаза добијеног на експерименталним животињама може се претпоставити да је након инхалационог уноса могућа појава кашља и бола у грлу, као и системског штетног ефекта на здравље, укључујући и ефекат на јетру. Након ингестије, могућа је појава неспецифичних симптома, укључујући и мучнину, повраћање, слабост и бол у стомаку.

Мере прве помоћи: у случају контакта са кожом неопходно је уклонити одећу и обилно испирати водом и сапуном (најмање 15 минута). У случају контакта са очима неопходно је прво уклонити сочива, а након тога обилно испирати водом (најмање 10 минута). Након ингестије/инхалације/контакта са очима обавезно се обратити надлежној медицинској установи.

При инхалационој експозицији изнети особу из контаминиране атмосфере, а уколико дође до престанка дисања обезбедити вештачку вентилацију. Не изазивати повраћање. Не постоји специфични антидот, терапија је симптоматска.

Лечење: за детаљна упутства о лечењу обратити се Центру за контролу тровања ВМА, телефон 011/36 08 440, Црнотравска 17, Београд.

Мере заштите: приликом рада са препаратом не пити, не јести, не пушити, избегавати контакт са кожом и очима и носити одговарајућу заштитну одећу, гумене чизме и гумене рукавице, заштиту за лице и очи. После руковања, скинути заштитну одећу и средства и опрати се водом и сапуном. У просторијама спровести адекватну вентилацију и контролисати ниво експозиције. Уколико је потребно, носити одговарајуће респираторе.

Складиштење: чувати у добро затвореној, оригиналној амбалажи, у просторијама са вентилацијом, на хладном и сувом месту, далеко од сунчеве светлости и извора топлоте, ван дохвата деце и одвојено од хране, пића и сточне хране. Избежавати складиштење изнад 35°C.

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ

Припрема за рециклажу:

- Након употребе садржај амбалаже оцедити око 30 секунди.
- Садржај прелити у прскалицу.
- Испрану течност утростити заједно са припремљеним раствором за третирање.

Прикупљање:

- Враћање празне амбалаже врши се два пута годишње.
- Празна амбалажа мора задржати постојећу декларацију због утврђивања порекла амбалаже пестицида.

Chemical
Agrosava

TEATAR

фунгицид
концентриран суспензија (SC)

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
азоксистробин 250 g/l
ФУНГИЦИД КАТЕГОРИЈЕ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ: 11

5ml

ПРЕ ПРИМЕНЕ ОВОГ СРЕДСТВА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО

ПРИМЕНА: TEATAR је системички, трансламарни фунгицид који се користи за сузбијање проузроковача сушења катерица махине, пламенаће и поплонике винове лозе, у концентрацији 0,075% (7,5 ml у 10 l воде). За сузбијање проузроковача пламенаће и црне пегавости кромпира и парадајза, као и за сузбијање проузроковача пламенаће крестовца, у количини 0,75 l/ha (7,5 ml на 100 m²).

Решиони: МПШВ, РС, УЗБ, бр: 321-01-2193/2013-11 од 16.04.2014. године са свим важећим изменама и допунама.
Дозвола за промет у Републици Српској, МПШВ, бр: 12.03.3-330-8243/14 од 02.02.2015. године.

Датум произвођаче и број шарже: на амбалажи.

Рок употребе: 3 године.



ПАЖЊА! Штетно ако се удише. Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. Избегавати удисање прашина/дима/гаса/магле/паре/спреја. Користити само на отвореном или у добро проветреном простору. Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину. Позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару уколико се не осећате добро. **АКО СЕ УДИШЕ:** изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање. Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима. Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.



Позитивне ознаке безбедности за заштиту здравља људи и животиња и животне средине:
SP 1 – Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.
SPo 2 – После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

Произвођач: Chemical Agrosava d.o.o. Палимира Тољатија 5/IV, Нови Београд
тел: 011/7852-770, факс: 011/2609-026, www.agrosava.com

Увозник и заступник за БиХ: Agropex d.o.o., Обудовац
Република Српска, тел/факс: +387 54 643 141